

C'est un test coté. Ce test comprend cinq questions. La note de passage est 100 %. Si vous obtenez une note de 100 % à la fin de ce test, vous pourrez imprimer un certificat. Pour obtenir la note de passage, vous devez répondre correctement à toutes les questions. Si vous réussissez le test, on vous remettra un certificat.

Question 1

Parmi les pratiques suivantes, laquelle ou lesquelles reflètent des politiques de réduction des risques d'infection respiratoire?

Sélectionnez tous les éléments pertinents. Cochez « ✓ » la case appropriée.

- A. Rester à la maison lorsqu'on a de la fièvre ou une nouvelle toux, ou qu'on manque de souffle.
- B. Demander aux visiteurs de reporter leurs visites s'ils commencent à tousser ou à avoir de la fièvre.
- C. Vérifier qu'on manipule de façon sécuritaire les objets pointus ou tranchants.
- D. Obtenir le vaccin annuel contre la grippe.

Question 2

Des fournisseurs de soins de santé discutent d'immunisation. Quel(s) énoncé(s) montre(nt) que le fournisseur de soins connaît les pratiques exemplaires en matière d'immunisation?


Sélectionnez tous les éléments pertinents. Cochez « ✓ » la case appropriée.

- A. J'obtiens tous les ans le vaccin contre la grippe.
- B. Je ne crois pas à l'immunisation; je dis toujours aux autres de ne pas accepter les injections qu'on leur propose.
- C. Je ne sais pas si j'ai déjà eu la varicelle; j'ai perdu mon dossier d'immunisation en changeant de domicile. Je dois vérifier mon statut et déterminer si j'ai besoin de vaccins d'appoint.
- D. Mon établissement n'organise pas de clinique d'immunisation pour le personnel et je ne prends pas le temps de vérifier où me faire vacciner.

Question 3

Le babillard indique où auront lieu les prochaines séances de formation sur la prévention et le contrôle des infections. Vous avez vu certains collègues faire des erreurs. Indiquez les séances de formation qui les aideront à corriger leurs erreurs.

Tracez une ligne pour connecter le scénario à l'affiche de la session de formation correcte sur le tableau d'affichage.



Un fournisseur de soins de santé ne sait pas quelle est la plus importante mesure qu'il peut prendre pour prévenir la propagation d'infections.

Un fournisseur de soins de santé utilise un brassard de sphygmomanomètre auprès d'un client/patient/résident puis le réutilise immédiatement auprès d'un second.

Un fournisseur de soins de santé consomme des aliments et des boissons à un poste de soins infirmiers.

Un fournisseur de soins de santé porte la même paire de gants durant tout son quart de travail.

Question 4

Examinez ce qui se passe dans la salle d'attente. Repérez le(s) patient(s)/client(s) qui respecte(nt) les consignes d'étiquette respiratoire.

Sélectionnez tous les éléments pertinents. Cochez «✓» la case appropriée.

- A. Une personne se lave les mains après avoir jeté un papier mouchoir à la poubelle.
 - B. Une personne se couvre la bouche avec la main au moment de tousser.
 - C. Une personne ne se couvre pas la bouche avec la main au moment de tousser.
 - D. Une personne tousse et porte un masque
-

Question 5

Indiquez quelle(s) mesure(s) constitue(nt) une pratique sécuritaire de manipulation d'objets pointus ou tranchants.

Sélectionnez tous les éléments pertinents. Cochez «✓» la case appropriée.

- A. Placer des contenants pour objets pointus ou tranchants aux points de service.
 - B. Ramasser en même temps tous les rasoirs jetables et les placer plus tard dans un contenant pour objets pointus ou tranchants.
 - C. Porter des gants au moment de ramasser les objets pointus ou tranchants qu'on trouve sur le plancher.
 - D. Remplacer les contenants d'objets pointus ou tranchants lorsqu'ils sont pleins aux trois quarts.
-

Il s'agit de la fin de l'essai

Commentaires supplémentaires

Question 1

Lorsqu'on reste à la maison pour soigner sa fièvre, une nouvelle toux ou des essoufflements, on minimise le risque de transmettre une infection respiratoire à d'autres personnes. Les fournisseurs de soins de santé qui restent à l'affût des symptômes d'infection respiratoire parmi les membres de l'entourage des patients sauront orienter les visiteurs et leur procurer l'information requise sur les risques associés au fait de rendre visite à un patient lorsqu'on est malade. En vérifiant qu'on manipule de façon sécuritaire les objets pointus ou tranchants, on réduit le risque de contracter une infection transmise par le sang, mais non une infection respiratoire. Il a été démontré que le vaccin annuel contre la grippe réduit les décès et maladies graves causés par la grippe.

Question 2

- L'immunisation aide à protéger les fournisseurs de soins de santé et autres personnes.
- Le statut vaccinal des professionnels de la santé doit être à jour.
- Les fournisseurs de soins de santé devraient savoir où obtenir leur(s) vaccin(s).

Question 3

Le port d'une même paire de gants pendant un quart complet occasionne des risques de transmis-

sion d'agents infectieux. Les fournisseurs de soins de santé doivent retirer immédiatement l'équipement de protection individuelle (les gants) après son utilisation et se laver les mains. Les fournisseurs de soins de santé doivent apprendre quand et comment utiliser l'équipement de protection individuelle.

L'utilisation de matériel médical contaminé auprès de clients/patients/résidents entraînera la propagation d'infections. Les fournisseurs de soins de santé doivent nettoyer et désinfecter le matériel médical entre chaque patient.

Les fournisseurs de soins de santé doivent comprendre l'importance de l'hygiène des mains pour prévenir la propagation des infections. Le respect des quatre moments de l'hygiène des mains protégera le fournisseur de soins de santé et les clients/patients/résidents.

La consommation d'aliments et de boissons dans les aires de soins expose le fournisseur de soins de santé à des risques d'infection gastrointestinale. Les fournisseurs de soins de santé doivent observer les politiques régissant la santé et l'hygiène au travail.

Question 4

Lorsqu'on tousse dans ses mains, on les contamine. Le fait de tousser sans se couvrir la bouche peut transmettre une infection respiratoire à une distance de deux mètres (ou six pieds). Le port d'un masque aide à empêcher la propagation d'agents infectieux. On aide à réduire la transmission d'agents respiratoires infectieux des mains aux surfaces lorsqu'on se lave les mains après avoir toussé ou jeté des papiers mouchoirs.

Question 5

Les contenants pour objets pointus ou tranchants devraient être placés là où on utilise ces objets de façon à assurer leur élimination sécuritaire. On devrait placer immédiatement au point de service les objets pointus ou tranchants dans des contenants appropriés, plutôt que de les ramasser et de les jeter ultérieurement. Utilisez toujours des pinces pour ramasser les objets pointus ou tranchants usagés qu'on trouve sur le plancher. Remplacez les contenants pour objets pointus ou tranchants lorsqu'ils sont pleins aux trois quarts. Ne dépassez pas la ligne de remplissage des contenants pour objets pointus ou tranchants.